


## แนวทางการรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2



| ●ข้อห้ามในการใช้ยาเม็ดลดระดับน้ำตาลในเลือด  | ●●● ลักษณะที่ไม่น่าจะได้ผลจากการใช้ยาเม็ดลดระดับน้ำตาลในเลือด                                      |
|---|--|
| 1. โรคตับ โรคไต<br>2. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 โรคเบาหวานจากตับอ่อน<br>3. ภาวะ Stress<br>4. ระหว่างผ่าตัด<br>5. ระหว่างตั้งครรภ์<br>6. ภาวะซูกันในโรคเบาหวาน<br>7. แพ้ยาซัลฟ่า (เฉพาะ Sulfonylurea)<br>8. ภาวะ Poor tissue perfusion (เฉพาะ biguanide) | 1. อายุต่ำกว่า 40 ปี<br>2. ผอม<br>3. เป็นมานานกว่า 5 ปี<br>4. เคยฉีดอินซูลินมากกว่า 40 ยูนิตต่อวัน |

### ชนิดของยาเม็ดลดระดับน้ำตาลในเลือดและวิธีใช้ ( ที่มีใช้ในโรงพยาบาล )

| ชนิด                               | ชื่อยา         | ขนาดยา<br>(มก/วัน) | วิธีการใช้        | จำนวนครั้ง<br>ต่อวัน |
|------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| I Insulin secretagogue             |                |                    |                   |                      |
| - Short acting , second generation | Glicazide      | 40 - 320           | ก่อนอาหาร 30 นาที | 1-2                  |
| - Long acting , second genertion   | Glibenclamide  | 2.5 - 20           | ก่อนอาหาร 30 นาที | 1-2                  |
| - Long acting , First generation   | Chlorpropamide | 125 - 500          | ก่อนอาหาร 30 นาที | 1                    |
| II Insulin sensibizer              |                |                    |                   |                      |
| - Biguanide                        | Metformin      | 500 - 3,000        | หลังอาหาร         | 1-3                  |